



POMODORO

Programma di nutrizione fogliare

Epoche di intervento	Prodotti	Dosi	Note
Al trapianto *	FERTIBAM 38 + CHELOBAM Zn	30-40 kg/ha 2-3 kg/ha	Per favorire radicazione e sviluppo iniziale delle plantule
Post-trapianto	AMINIC + VIRIDE + FOLIARBAM 60	2 kg/ha 1 kg/ha 2,5-3 kg/ha	Superamento stress da trapianto. Induce un pronto sviluppo vegetativo
Prefioritura	FOLIARBAM 68 + CORREBOR + ALGABAM	3 kg/ha 1 kg/ha 1,5-2 kg/ha	Per favorire i processi di fioritura (fertilità fiori, impollinazione, fecondazione, allegagione, ecc.)
Allegagione primi palchi/ formazione bacche	FOLIARBAM 60 + ALGABAM	3,5 kg/ha 1,5-2 kg/ha	Favorisce lo sviluppo e l'accrescimento dei frutti
Da ingrossamento bacche a maturazione	FRUGES	3,5-4 kg/ha	Migliora le caratteristiche finali del frutto (consistenza, colore, residuo ottico, ecc.)
	Effettuare applicazioni ripetute a distanza di 12-15 giorni. Da inizio invaiatura intervenire con CALFRUIT (3-4 kg/ha) ad intervalli di 15 giorni fino a maturazione.		

* Applicazione al terreno localizzata sulla fila

N.B.

In caso di trattamenti con prodotti a base di rame non associare AMINIC e ridurre la dose di ALGA.

I trattamenti fogliari vanno effettuati nelle ore più fresche della giornata.