

SPINACIO

Alla semina, in copertura e localizzato sulla fila, **FERTIBAM 38** (30 kg/ha) + **CHELOBAM Zinco** (1 kg/ha). Se non si ha la possibilità di localizzare alla semina eseguire un trattamento in pre-semina a pieno campo utilizzando: **FERTIBAM 38** (90 kg/ha) e **CHELOBAM Zinco** (2 kg/ha).

Programma di nutrizione fogliare

Epoche di intervento	Prodotti	Dosi	Note
Piantine a 8-10 cm	AMINIC FOLIARBAM 60 VIRIDE	2 kg/ha 2,5-3 kg/ha 1 kg/ha	Stimola una pronta risposta vegetativa nelle prime fasi delle piantine
Inizio formazione rosetta fogliare	ALGABAM CORREBOR FOLIARBAM 68	2 kg/ha 1 kg/ha 2,5-3 kg/ha	Contribuisce ad una corretta formazione della rosetta fogliare
10 giorni dal trattamento precedente	CHELOBAM Mg CORREMAN L. FOLIARBAM 60	1 kg/ha 1 kg/ha 3 kg/ha	Per evitare microcarenze durante l'accrescimento della rosetta fogliare
Accrescimento della rosetta fogliare	ALGABAM FOLIARBAM 60 VIRIDE	2 kg/ha 3 kg/ha 1 kg/ha	Per esaltare il rigoglio vegetativo della pianta

N.B. Non miscelare AMINIC con prodotti a base di rame.
Effettuare i trattamenti fogliari nelle ore più fresche del giorno.

Programma di fertirrigazione

Epoche di intervento	Prodotti	Dosi	Note
Post-emergenza	Solfato Ammonico	25 kg/ha	Eseguire 3 trattamenti
Da rosetta fogliare in poi	Potassio Nitrato	25 kg/ha	Eseguire 3 trattamenti