

CILIEGIO

Proposta di nutrizione fogliare e radicale

Epoche di intervento	Prodotti	Dosi	Note
Inizio fioritura	PROPOLIS-BAM	200 g/hl	Per favorire impollinazione richiamando i pronubi
Ripetere l'operazione in 2 interventi a distanza di pochi giorni			
Caduta petali / allegagione	FARO TOP 30 VIRIDE	200 g/hl 150 g/hl	Per favorire allegagione e la resistenza alle basse temperature
Da scamicatura per tutta la fase di ingrossamento frutto	FOLIARBAM 60 FARO TOP 30 VIRIDE	200 g/hl 200 g/hl 150 g/hl	Per favorire uno sviluppo vegetativo equilibrato e l'ingrossamento dei frutti, gestendo le micro-carenze
	Effettuare 2-3 applicazioni a distanza di 7-10 giorni		
Da inizio invaiatura *	FRUGES	200-250 g/hl	Per favorire lo sviluppo e le caratteristiche organolettiche dei frutti
	Ripetere l'intervento a distanza di 7 giorni		

* **N.B.** Contro spaccature fisiologiche o da violente piogge in prossimità della raccolta e per garantire una migliore gestione del post-raccolta, si suggerisce l'applicazione di **CALFRUIT** a dosi di 500-600 g/hl in 3-5 interventi da inizio accrescimento frutto fino in prossimità della raccolta (meglio se ripartiti in prima e dopo l'indurimento del nocciolo).

N.B. Nei trattamenti delle fasi centrali del ciclo vegetativo è sempre consigliata l'aggiunta di **AMBIO** a dosi di 150-200 g/hl come veicolante azotato della miscela e per una spinta nutrizionale aggiuntiva.

N.B. Valutare sempre il tipo di varietà presa in esame e le relative specifiche caratteristiche fisiologiche.

N.B. I trattamenti fogliari vanno effettuati nelle ore più fresche e con bagnatura adeguata.

FERTIRRIGAZIONE

A partire dalla ripresa vegetativa iniziare le applicazioni per via radicale con **FERROTER 53** a 5-10 g/pianta + **HUMIC / ATTIVATORE RADICALE** (a seconda delle esigenze) a dosi di etichetta e proseguendo successivamente questi apporti ogni 15/30 giorni a seconda del bisogno riscontrato, della tipologia di impianto, della varietà, di terreno e della tipologia di stagione.