

# OLIVO

## Proposta di nutrizione fogliare e radicale

Epoche di intervento	Prodotti	Dosi	Note
Risveglio e fasi vegetative	<i>Linea</i> <b>FARO</b> o <b>TROFEO</b> <b>FRUGES</b>	200 g/hl 250 g/hl	Assecondare al meglio l'uscita dalle fasi fredde
Bottoni fiorali visibili	<b>KAREN Mg</b>	100-150 g/hl	Una integrazione di magnesio chelato per una ottimale fotosintesi
Inizio fioritura	<b>CORREBOR LIQUIDO</b> <i>Linea</i> <b>FARO</b> o <b>TROFEO</b>	150 g/hl 150-200 g/hl	Per ottimizzare al massimo la fase di fioritura e allegagione
Post allegagione	<b>FARO VERDE</b> <b>VIRIDE</b>	200 g/hl 100-150 g/hl	Contribuire al miglioramento dell'epidermide delle drupe e ad una ottimale fotosintesi
Ingrossamento frutti	<b>FRUGES</b>	250 g/hl	Per migliorare la qualità delle drupe

**N.B.** I trattamenti fogliari vanno effettuati nelle ore più fresche e con bagnatura adeguata.

### **IN FERTIRRIGAZIONE AL SUOLO**

A partire dalla ripresa vegetativa iniziare le applicazioni per via radicale con **FERROTTER 53** a dosi etichetta + **HUMIC / ATTIVATORE RADICALE / VALZER** (a seconda delle esigenze) a dosi etichetta e proseguendo successivamente questi apporti ogni 15/30 giorni a seconda del bisogno riscontrato, della tipologia di impianto, di terreno e della tipologia di stagione.