



CIPOLLA

Proposta di programma nutrizione

| Epoche di intervento | Prodotti | Dosi | Note |
|---|--|--------------------------------------|---|
| Alla semina * | FERTIBAM 38 CHELOBAM Zn | 30-40 kg/ha 1,5-2 kg/ha | Per favorire germinazione, radicazione e sviluppo iniziale della plantula |
| Circa alle prime foglie vere | AMBIO TROFEO o FARO TOP FOSFITUM | 2 kg/ha 2 kg/ha 300-400 g/hl | Per favorire le prime fasi di sviluppo della pianta ottimizzando le coperture |
| Dopo 10 giorni dal trattamento precedente | AMBIO VIRIDE FOSFITUM | 2 kg/ha 1,5 kg/ha 300-400 g/hl | Per sviluppo della pianta, prevenzione delle clorosi e aiuto delle coperture |
| Dopo 10 giorni dal trattamento precedente | FOLIARBAM 60 FOSFITUM | 2-3 kg/ha 300-400 g/hl | Per garantire continuità nutrizionale nelle fasi di crescita di bulbo e di apparato fogliare |
| Fasi centrali del ciclo | (da valutare) | | |
| Fasi finali del ciclo di produzione con foglia attiva | FRUGES | 2,5-3 kg/ha | Per gestire al meglio le fasi finali calibrando la spinta vegeto/produttiva e apportando potassio |

* In solco, localizzato sulla fila, magari diluendo la soluzione con acqua per una maggior copertura.

N.B. Dal momento in cui è attiva la fertirrigazione si consigliano 1-2-3 interventi nelle fasi di maggior bisogno a dosi variabili di 5-10-15 kg/ha con **ATTIVATORE RADICALE** o **LYCOBAM** o **ORGAVIS AC** (a seconda delle esigenze e della situazione in corso).

N.B. Non miscelare AMBIO con prodotti a base di rame.