



PATATA

Proposta di programma nutrizione

Epoche di intervento	Prodotti	Dosi	Note
Al trapianto *	LYCOBAM o LYCOBIO	2-3 kg/per 1 ha di tuberi	Per favorire la prima partenza del tubero
Prime foglie vere			
(dopo 10 giorni circa dal trattamento fitosnitario sulle prime foglie vere)	FARO TOP 30 FOSFITUM AMBIO	2 kg/h 400 g/hl 2-3 kg/ha	Per favorire le prime fasi di sviluppo della pianta ottimizzando le coperture
(dopo 10 giorni circa dal precedente trattamento)	VIRIDE FOSFITUM AMBIO	1,5 kg/ha 400 g/hl 2-3 kg/ha	Per sviluppo della pianta, prevenzione delle clorosi e aiuto delle coperture
Soglie di pre-fioritura			
Piena fioritura	FOLIARBAM 60	2,5 - 3 kg/ha	Per un importante aiuto nutrizionale
(dopo 10 giorni circa dal precedente trattamento)	FOLIARBAM 60	2,5 - 3 kg/ha	Per un importante aiuto nutrizionale
Fasi finali di foglia attiva	FRUGES	2,5 - 3 kg/ha	Per gestire al meglio le fasi finali calibrando la spinta vegeto/produttiva apportando fondamentale potassio
Da ripetere almeno per 2 interventi			

*Applicazione avendo cura di bagnare il più possibile il tubero in fase di trapianto.

N.B. I trattamenti fogliari vanno effettuati nelle ore più fresche e con bagnatura adeguata.

FERTIRRIGAZIONE

N.B. Dal momento in cui è attiva la fertirrigazione si consigliano 2-3 interventi nelle fasi di maggior bisogno a dosi di 10 - 20 kg/ha con **ATTIVATORE RADICALE** o **LYCOBAM** o **ORGAVIS AC** o **VALZER** (a seconda delle esigenze, degli obiettivi e delle caratteristiche dell'impianto).