



### CONFEZIONE

- > **Tanica 5 kg**  
(cartone da 4 pz.)
- > **Tanica 25 kg**
- > **Fusto 200 kg**
- > **Cisternetta 1200 kg**

### FORMULAZIONE

Liquido



# LYCOBAM

## CONCIME ORGANO-MINERALE

Concime organo-minerale Azotato  
in sospensione

### TITOLI DICHIARATI

<b>Azoto (N)</b> totale.....	<b>10%</b>
di cui: <b>Azoto (N)</b> organico.....	<b>2,5%</b>
<b>Azoto (N)</b> ureico.....	<b>7,5%</b>
<b>Carbonio (C)</b> organico.....	<b>8%</b>

**COMPONENTI ORGANICHE:** Epitelio animale idrolizzato fluido.

**COMPONENTI MINERALI:** Urea.

### DENSITÀ A 20°C

1,18 kg/L

### CARATTERISTICHE

LYCOBAM è un concime liquido pensato appositamente per il pomodoro e per tutte le colture orticole da pieno campo fertirrigue, che risulta altamente e prontamente assimilabile nel terreno, facile e pratico nell'impiego. Particolarmente indicato nelle fasi di maggior stress vegeto-produttivo e/o di richiesta "energetica" della pianta ha un effetto migliorativo sullo sviluppo della pianta, del tubero, o delle radici con riflessi positivi sulla produzione finale.

### COMPATIBILITÀ

LYCOBAM è compatibile con la maggioranza dei prodotti utilizzati in agricoltura. Si consiglia in ogni caso una prova di miscela preliminare, specialmente con concimi fosfatici.



**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO (applicazione radicale - fertirrigazione)**

<b>Colture</b>	<b>Dosi</b>	<b>Impieghi</b>
<b>Pomodoro</b>	10 - 15 kg /ha	2 o più interventi, consigliato particolarmente nelle fasi di "chiusura delle bine" e di "chiusura delle file".
<b>Orticole da pieno campo (peperone, melanzana, zucchini, lattughe, ecc.)</b>	10 - 20 kg/ha	Da 1 a 3 interventi. Fasi di crescita e di maggior bisogno vegeto/produttivo fino all'invasatura.
<b>Orticole in serra (pomodoro da mensa, peperone, melanzana, zucchini, lattughe, ecc.)</b>	1 - 2 kg ogni 1000 m <sup>2</sup>	Da 1 a 3 interventi. Fasi di crescita e di maggior bisogno vegeto/produttivo fino all'invasatura.
<b>Melone, Anguria</b>	10 - 20 kg/ha	Da 1 a 3 interventi. Fasi di crescita e di maggior bisogno vegeto/produttivo fino all'invasatura.
<b>Patata, Cipolla</b>	3 - 5 kg/ha* 10 -15 kg/ha**	*Al trapianto, direttamente nel solco. **Fasi di maggior bisogno vegeto/produttivo.
<b>Fragola</b>	1 - 2 kg ogni 1000 m <sup>2</sup>	Da 1 a 3 interventi. Fasi di crescita e di maggior bisogno vegeto/produttivo fino all'invasatura.

