



CONFEZIONE

- > **Tanica 5 kg**
(cartone da 4 pz.)
- > **Tanica 25 kg**

FORMULAZIONE

Liquido

ETICHETTATURA CLP



ATTENZIONE

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

VIXTOR

**PRODOTTO SPECIFICO
CONTENENTE CALCIO E
MAGNESIO,
CON AGENTE COMPLESSANTE
LIGNINSOLFONATO,
PER APPLICAZIONI
FOGLIARI (E RADICALI)
AD USO AGRICOLO**

TITOLI DICHIARATI

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua
(da cloruro).....8%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
(da cloruro).....5%
con agente complessante ligninsolfonato.

CARATTERISTICHE

VIXTOR è un prodotto specifico, a base di calcio e magnesio, contenente l'agente complessante ligninsolfonato, caratterizzato da un ottimo assorbimento da parte delle foglie.
Influisce positivamente nei confronti di numerose fisiopatie e previene tutte quelle situazioni provocate da carenze di calcio e magnesio. Il suo impiego ha riflessi positivi sulla produzione finale.



COMPATIBILITÀ

VIXTOR è compatibile con la maggior parte dei concimi e dei prodotti fitosanitari ad eccezione degli oli. In ogni caso bisogna procedere a prove preliminari.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO (applicazione fogliare)

Colture	Dosi	Impieghi
Pomacee e Drupacee	250 - 350 g/hl	Da frutticino formato/frutto noce sino ad invaiatura, interventi ripetuti a distanza di 10-20 gg.
Vite	250 - 350 g/hl	Accrescimento germogli - prefioritura - da mignolatura a chiusura grappolo
Uva da Tavola	150 - 300 g/hl	Accrescimento germogli - prefioritura - da mignolatura a chiusura grappolo
Actinidia	250 - 350 g/hl	2-3 interventi da accrescimento germogli a prefioritura.
Agrumi	150 - 300 g/hl	Da ingrossamento frutto a post invaiatura
Orticole pieno campo	2 - 3 kg/ha	2-3 interventi da allegazione a fasi di maturazione
Orticole in serra/tunnel	100 - 150 g/hl	2-3 interventi da allegazione a fasi di maturazione
Fragola	150 - 250 g/hl	1-3 interventi da post allegazione a post invaiatura
Cipolla	2 - 3 kg/ha	Fasi di accrescimento fogliare - accrescimento bulbo
Patata	2 - 3 kg/ha	Da sviluppo fogliare a fioriture
Industriali*, Sementiere*, Bietola	2 - 3 kg/ha	Fasi vegetative - post allegazione*
Floricole e ornamentali	150 - 250 g/hl	Fasi vegetative e di sviluppo fogliare

Per un eventuale uso in fertirrigazione si consiglia dai 10 ai 30 kg/ha ad applicazione secondo il bisogno.

AVVERTENZE

Eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giornata e con un volume di bagnatura adeguato.

In ambiente protetto si consiglia di non superare mai i 100 g/hl.

Eventuali ripetizioni distanziate di minimo 10 giorni.