



#### CONFEZIONE

- > **Tanica 5 kg**  
(cartone da 4 pz.)
- > **Tanica 25 kg**

#### FORMULAZIONE

Liquido

# FARO TOP 30

## ESTRATTO DI ALGA AD USO AGRICOLO

### COMPOSIZIONE

Estratto di alghe marine brune (*Ascophyllum nodosum*) (30% p/p = 35% p/v di prodotto secco) contenente amminoacidi, vitamine, fattori naturali di crescita.

### CARATTERISTICHE

FARO TOP 30 è un prodotto ottenuto per estrazione alcalina di alghe *Ascophyllum nodosum*, contenente amminoacidi, vitamine, fattori naturali di crescita. Induce una pronta risposta dei principali processi di crescita nella pianta, risultando particolarmente indicato per una pronta ripresa da stress o blocco vegetativo e nelle fasi di maggiore attività biologica, come fioritura ed ingrossamento frutti. Favorisce l'allegagione e le caratteristiche di pregio dei frutti (colore, serbavolezza, qualità organolettiche, uniformità di maturazione), con riflessi positivi su produzione e qualità finale; favorisce inoltre la resistenza nei confronti di avversità di varia natura abiotica (freddo, fisiopatie).

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i concimi fogliari e con gli antiparassitari in genere, esclusi gli oli. Si consiglia sempre una prova di miscibilità preliminare.



## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO (applicazione fogliare)

Colture	Dosi	Impieghi
Pomacee	200 - 250 g/hl	Mazzetti affioranti - bottoni - prefioritura - fioritura - allegagione - ingrossamento frutti
Drupacee	200 - 250 g/hl	Inizio fioritura - allegagione - scamiciatura - ingrossamento frutti
Vite, Uva da tavola	200 - 250 g/hl	Ripresa vegetativa - fasi di allungamento germogli - prefioritura - allegagione - ingrossamento acini
Actinidia	150 - 250 g/hl	Ripresa vegetativa - fasi di allungamento germogli - prefioritura - allegagione
Agrumi	150 - 250 g/hl	Ripresa vegetativa - pre/post fioritura - allegagione
Olivo	150 - 250 g/hl	Pre/post fioritura - ingrossamento frutti
Fragola	150 - 200 g/hl	Ripresa vegetativa - prefioritura - formazione frutti
Orticolore da pieno campo	2 - 3 kg/ha	Post-trapianto - fasi di sviluppo vegetativo - prefioritura - allegagione - ingrossamento frutti
Orticolore in serra	70 - 100 g/hl	Post-trapianto - fasi di sviluppo vegetativo - prefioritura - allegagione - ingrossamento frutti
Pomodoro	1,5 - 2 kg/ha	Fasi di maggior bisogno vegeto-produttivo
Patata	2 - 3 kg/ha	Da prime foglie a fioriture
Cipolla	1,5 - 2 kg/ha	Fino ad accrescimento bulbo
Industriali	1,5 - 2 kg/ha	Fasi di sviluppo vegetativo - pre/post fioritura
Colture da seme	1 - 1,5 kg/ha	Fasi di crescita/salita a seme - prefioritura

## AVVERTENZE

Eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giornata e con un volume di bagnatura adeguato.

In ambiente protetto si consiglia di non superare i 100 g/hl.

Si sconsiglia il trattamento in prossimità della raccolta.