



CE

CONFEZIONE

> **Sacchetto 2,5 kg**
(cartone da 8 pz.)

> **Sacco 10 kg**

FORMULAZIONE

Polvere solubile

FOLIAR BAM 60

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI N P K 20 20 20 con microelementi

TENORE DICHIARATO DI NUTRIENTI IN MASSA

Azoto (N) totale	20%
Azoto sotto forma nitrica	6%
Azoto sotto forma ammoniacale	5,2%
Azoto sotto forma ureica	8,8%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	20%
Anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile	20%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro	20%
Ossido di potassio (K_2O) idrosolubile	20%
Boro (B) potassio idrosolubile	0,05%
Rame (Cu) chelato con EDTA idrosolubile	0,01%
Manganese (Mn) chelato con EDTA idrosolubile	0,1%
Molibdeno (Mo) sodio idrosolubile	0,005%
Zinco (Zn) chelato con EDTA idrosolubile	0,01%
Intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile della frazione chelata: 4-9	

CARATTERISTICHE

Prodotto di elevatissima purezza e solubilità, a pH acido (più affine all’assorbimento cuticolare e stomatico), ideale per applicazioni fogliari. FOLIAR BAM 60 è un concime bilanciato universale estremamente versatile, con un contenuto equilibrato dei principali elementi della fertilità (e una triplice ripartizione azotata), impiegabile nelle diverse fasi del ciclo colturale. È estremamente indicato per uno sviluppo vegeto-produttivo equilibrato delle piante.

COMPATIBILITÀ

Il FOLIAR BAM 60 è compatibile con la maggior parte dei prodotti utilizzati in agricoltura; non utilizzare con dinitrocomposti, con oli, con zolfi colloidali e prodotti alcalini.

USO E DOSI (applicazione fogliare)

Colture	Dosi	Impieghi
Fruttiferi	200 - 300 g/hl	Ripresa vegetativa - pre/post fioritura - allegagione - accrescimento frutto
Vite e Actinidia	200 - 300 g/hl	Ripresa vegetativa - accrescimento - germogli - prefioritura - allegagione
Fragola	150 - 200 g/hl	Post trapianto - ripresa vegetativa - prefioriture - formazione frutti
Agrumi	150 g/hl	Da prefioritura a fasi di ingrossamento frutto
Olivo	150 - 300 g/hl	Ripresa vegetativa - accrescimento drupe - invaiatura
Orticolare pieno campo	2,5 - 3,5 kg/ha	Post semina/trapianto - fasi di crescita vegetativa - prefioritura - formazione/ingrossamento frutti
Orticolare in serra/tunnel	100 - 150 g/hl	Post semina/trapianto - fasi di crescita vegetativa - prefioritura - formazione/ingrossamento frutti
Industriali e Sementiere	2 - 3 kg/ha	Fasi di sviluppo vegetativo - prefioritura - post allegagione
Patata, Cipolla, Ortaggi da foglia	2 - 3 kg/ha	Fasi di sviluppo fogliare
Pomodoro da industria	2 - 3 kg/ha	Da prime fioriture a ingrossamento bacche nei palchi
Cereali	3 - 5 kg/ha	Levata - spigatura

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

Per un eventuale uso in fertirrigazione si consiglia dai 10 ai 20 kg/ha ad applicazione secondo il bisogno.

AVVERTENZE

Eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giornata e con un volume di bagnatura adeguato. In ambiente protetto si consiglia di non superare le dosi consigliate.